

平成25年度

第2回

学校保健委員会



福岡市立西新小学校

予防接種スケジュール

大切な子どもをVPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、接種できる時期になったらできるだけベストのタイミングで、忘れずに予防接種を受けることが重要です。このスケジュールはNPO法人VPDを知って、子どもを守る会の会によるものでも早期に免疫をつけるための提案です。お子さまの予防接種に関しては、地域ごとの接種方法やVPDの流行状況に応じて、かかりつけ医と相談のうえスケジュールを立てましょう。

| ワクチン名 | 接種済み | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
|---|--|--|----|----|----|----|----|----|----|
| B型肝炎 <small>不活化ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ② | ③ | | | | |
| ロタウイルス <small>生ワクチン</small> | 1価 <input type="checkbox"/> 5価 <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| ヒブ <small>不活化ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 小児用肺炎球菌 (13価) <small>不活化ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 四種混合(DPT-IPV) 三種混合(DPT)・ポリオ(IPV単独) <small>不活化ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| BCG <small>生ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | | | | | | |
| MR (麻しん風しん混合) <small>生ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| おたふくかぜ <small>生ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| みずぼうそう (水痘) <small>生ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 日本脳炎 <small>不活化ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| インフルエンザ <small>不活化ワクチン</small> | 毎秋 | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| A型肝炎 <small>不活化ワクチン</small> | <input type="checkbox"/> | 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |

ロタウイルスワクチンには、1価ワクチンと5価ワクチンがあります。できるだけ生後14週6日までに接種を開始し、それぞれの必要接種回数を受けましょう。

ロタウイルス・ヒブ
小児用肺炎球菌・四種混合の必要接種回数を早期に完了するには、同時に接種を受けることが重要です。

2013年10月までの7価ワクチンに含まれていない6価分の免疫をつけるために、7価の接種完了者も8週以上あけて13価ワクチンを1回接種(補助的追加接種)

二種混合(OT) :
11歳で追加接種
(接種対象11-12歳)

MR(麻しん風しん混合) : 小学校入学の前年(幼稚園・保育園の年長に相当)1年間に接種(4月~6月がおススメ)

1歳の誕生日が来たら同時接種を受けましょう。
MR・おたふくかぜ・みずぼうそうの同時接種は、ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合の追加接種の1週間後に受けることもできます。

追加接種は、初回接種から3か月の間隔をあけて受けましょう。

インフルエンザ :
毎年、10月から11月ごろに接種しましょう。

1歳から受けられます。1回目の2-4週後に2回目、その約半年後に3回目を接種します。

不活化ワクチン 定期 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。
生ワクチン 任意 多くは有料(自己負担)。ワクチンによっては公費助成があります。任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。
同時接種 : 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。国や日本小児科学会は乳幼児の接種部位として大腸外側部も推奨しています。くわしくはかかりつけ医にご相談ください。

定期予防接種の対象年齢 \leftrightarrow おススメの接種時期(数字は接種回数)
 ●次にほかの種類別のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。

詳しい情報は <http://www.know-vpd.jp/> **VPD**